



محدوده تاریخ کاشت و برداشت مناسب چغندر قند پاییزه به همراه رقم‌های توصیه شده برای هر منطقه (تاریخ انتشار: تیر ۱۴۰۳)

استان	منطقه	تاریخ کاشت	رقم‌های مناسب	تاریخ برداشت
ایلام	دهلران، دره شهر	دهه سوم شهریور تا دهه اول آبان	آنتک، پالما، چیمنه، لوانته، مراک، مونوتونا، روزا گلد، روزاناب، روزالیتا، هانی، هستون، آمالدی، <u>نرو</u> ، کویانا، هما، آنور، مونوتونا، جونکال، <u>سوانی</u> ، <u>بی تی اس ۲۰۱۵</u> ، <u>آلانی</u> ، <u>سویت دم</u> ، <u>آرمسا</u> ، <u>فادلا</u>	دهه دوم اردیبهشت تا دهه دوم خرداد
خوزستان	کلیه مناطق	دهه سوم شهریور تا دهه اول آبان	اسپارتاک، آنتک، پالما، چیمنه، لوانته، مراک، روزا گلد، شانون، گراناته، <u>کلارا</u> ، سمپر، کادیلاک، آکازیا، <u>آلانی</u> ، روزاناب، کالاس، پورتال، هانی، هستون، آمالدی، باروسا، بلانا، پیکاسو، داوینچی، روزالیتا، جونکال، باس، <u>نرو</u> ، بی تی اس ۵۹۵۰، کویانا، <u>سوانی</u> ، هما، آنور، وانجلیس، توررو، مونوتونا، <u>سویت دم</u> ، <u>بی تی اس ۲۰۱۵</u> ، <u>آرمسا</u> ، <u>فادلا</u>	دهه اول اردیبهشت تا دهه سوم خرداد
کرمانشاه	سرپل ذهاب، قصر شیرین، گیلان غرب	دهه دوم مهر	مونوتونا	دهه سوم اردیبهشت تا دهه سوم خرداد
		دهه سوم مهر	کویانا، جونکال	
		دهه اول آبان	<u>نرو</u> ، روزا گلد، چیمنه	
خراسان جنوبی	فردوس، بیرجند، نهبندان، سربیشه، طبس	نیمه اول مهر	مونوتونا	دهه سوم خرداد تا دهه دوم تیر
خراسان رضوی	گناباد، فیض آباد، خواف، سرخس، تربت جام (مناطق گرم)، کاشمر، بردسکن، تایباد	نیمه دوم مهر	مونوتونا	دهه سوم خرداد تا دهه دوم تیر
		دهه دوم مهر	روزا گلد، کویانا، لوانته، <u>جونکال</u> ، <u>نرو</u>	
		دهه سوم مهر		
فارس	اقلیم گرم (قیروکارزین، خنج، مهر، گراش)	دهه اول مهر تا نیمه اول آبان	آنتک، پالما، لوانته، مراک، شانون، سمپر، کادیلاک، آکازیا، <u>آلانی</u> ، روزاناب، کالاس، پورتال، هانی، هستون، روزالیتا، باس، بی تی اس ۵۹۵۰، کویانا، هما، آنور، وانجلیس، مونوتونا، چیمنه، روزا گلد، <u>کلارا</u> ، آمالدی، باروسا، داوینچی، جونکال، <u>نرو</u> ، توررو، <u>بی تی اس ۵۹۵۰</u> ، <u>گراناته</u> ، <u>سوانی</u> ، <u>سویت دم</u> ، <u>بی تی اس ۲۰۱۵</u> ، <u>آرمسا</u> ، <u>فادلا</u>	دهه دوم اردیبهشت تا دهه سوم خرداد
		نیمه دوم مهر	کویانا، مونوتونا	
		نیمه اول آبان	<u>نرو</u> ، <u>جونکال</u> ، چیمنه، روزا گلد، توررو، <u>بی تی اس ۲۰۱۵</u> ، <u>گراناته</u> ، <u>سوانی</u> ، <u>سویت دم</u> ، <u>بی تی اس ۲۰۱۵</u> ، <u>آرمسا</u> ، <u>فادلا</u>	
گلستان	گنبد، گرگان، آق قلا، کلاله، علی آباد، بندر ترکمن، مینودشت، آزادشهر، گالیکش، سیمین شهر، کردکوی	دهه سوم مهر	مونوتونا، کویانا	دهه سوم خرداد تا دهه سوم تیر
		دهه اول آبان	روزا گلد، <u>جونکال</u>	
		دهه دوم آبان	<u>سوانی</u> ، <u>نرو</u> ، <u>داوینچی</u>	
اردبیل	مغان	دهه اول آبان	مونوتونا	دهه سوم خرداد تا دهه دوم تیر
		دهه دوم آبان	کویانا	
		دهه سوم آبان	چیمنه، <u>جونکال</u> ، <u>نرو</u>	
کهکیلویه و بویراحمد	گچساران، جعفر آباد	نیمه اول مهر	مونوتونا، کویانا، <u>جونکال</u>	دهه سوم اردیبهشت تا دهه سوم خرداد
		نیمه دوم مهر	آنتک، پالما، چیمنه، لوانته، مراک، روزا گلد، کادیلاک، توررو، بی تی اس ۲۰۱۵، هما، مراک، شانون، گراناته، سمپر، آکازیا، هانی، هستون، آمالدی، <u>وانجلیس</u> ، <u>سویت دم</u> ، <u>بی تی اس ۲۰۱۵</u> ، <u>گراناته</u> ، <u>سوانی</u> ، <u>آرمسا</u> ، <u>فادلا</u> ، <u>نرو</u> ، <u>آلانی</u>	

مأخذ: مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند

توجه:

- (۱) در خصوص کشت پاییزه چغندر قند در سایر مناطق کشور که در این جدول ذکر نشده است، به دلیل عدم وجود مطالعات پیشین، توصیه‌های فنی خاصی وجود ندارد.
- (۲) ارقامی که زیر نام آنها در جدول فوق خط کشیده شده است ارقام جدید هستند و لازم است کاشت آنها طبق بند ۱ دستورالعمل پیوست انجام شود.
- (۳) در هر استان، کشت ارقام توصیه شده برای اولین بازه زمانی در بازه‌های زمانی دیرتر نیز بلامانع است در حالی که کشت ارقام توصیه شده برای بازه‌های زمانی دیرتر در بازه زمانی زودتر به هیچ وجه امکان پذیر نیست.